



Kleintier Tagesklinik Dr. Zeißler | Dr.M. Zeißler | Kaiserstr. 66 | 08209 Auerbach

Operationsvorbereitung und Nachsorge bei einer TPLO

Lieber Tierbesitzer,

Ihr Tier braucht eine Operation und Sie haben hierfür schon einen Termin in unserer Klinik bekommen, folgende Dinge sollten Sie vorher und nachher beachten um Ihren Liebling zu begleiten:

Fellpflege: Besonders bei Hunden und Katzen mit dichtem Unterfell ist ein Bad vor einer Operation empfehlenswert um das Fell und die Haut zu reinigen und damit das Risiko für eine Wundinfektion zu verringern.

Mahlzeiten: am Vortag spätestens um 16h das letzte Mal
Wasser darf bis früh bereit stehen
am Tag der Operation abends nur eine kleine Menge für die Tabletten
Wasser darf abends wieder bereit stehen

Bewegung:

HUND

Am Tag der Operation bitten wir Sie mit Ihrem Hund ausreichend lange spazieren zu gehen, damit er sich entsprechend lösen kann.

Nach der Operation ist eine **strikte Ruhighaltung** erforderlich für mindestens 8 Wochen.
Treppen steigen ist nicht erlaubt.

Belastungsdauer (langsamer Spaziergang an der Leine):

Woche 1 :	3x tägl.	5 min
Woche 2:	3x tägl.	7min
Woche 3-4:	3x tägl.	10min
Woche 5-6:	3x tägl.	15min
Woche 7-8:	3x tägl.	20 min

Sollte Ihnen die Ruhighaltung Schwierigkeiten bereiten, können wir Ihnen gern Beruhigungsmittel mitgeben.

KATZE:

Katzen sollten bis kurz vor dem Transport Zugang zur Katzentoilette haben.

Strikte Ruhighaltung im Kinderlaufstall für mind. 8 Wochen, die Katze darf nicht springen oder rennen.
Die Toilette, das Futter und seine Schlafstätte muss alles zusammen in der Unterbringung sein.
Der Laufstall muss oben geschlossen sein!!!!

weiter Nachsorgetermine: Verbandswechsel alle 2-3 Tage für ca. 1 Woche i.d.R. bei Ihrem Haustierarzt, dafür können Sie gerne schon Termine vereinbaren
Fäden ziehen nach 10-14 Tage nach der Operation

Röntgenkontrolle in unserer Klinik nach 6-8 Wochen

Wundheilung: **Halskragenpflicht für mindestens 14 Tage damit es zu keiner Wundinfektion kommt**
nach dem Fäden ziehen kann starkes Be lecken der Narbe/ des Beines, zur einer Wundinfektion führen; dann sollte der Halskragen länger getragen werden
tägl. Wundkontrolle nach Abnahme des Verbandes (auf Schwellung Sekretion, Rötung)

Physiotherapie: 4 Wochen nach Operation angeraten, gern können wir Sie an Frau Krappmann vermitteln

Vielen Dank, das Team der Tierklinik Dr. Zeißler